

內視鏡檢查前須知及注意事項

1. 檢查前需依【清腸藥使用說明書】準備，並務必完整服用二劑清腸藥，確保腸道清潔，避免影響檢查品質與診斷準確度。
2. 藥物注意事項：
 - ⌚ 抗凝血藥物【保栓通 Plavix、伯基 Bokey、阿斯匹靈等】：檢查前需停藥 3 天（不含體檢日），降低息肉切除出血風險。
 - ⌚ 高血壓藥物：若為麻醉檢查，請【依醫師指示持續服用】，不可自行停藥。
 - ⌚ 糖尿病藥物：檢查前一晚及檢查當日停藥。
 - ⌚ 減重藥物：請停藥 14 天。
 - ⌚ 慢性病藥物：檢查前一晚可照常服用；當天早上請攜帶藥物，於空腹檢查後再服用。
3. **請勿塗指甲油【手部美甲卸除】**、勿戴隱形眼鏡及飾品（戒指、耳環等），以便執行麻醉時觀察血液循環狀況。
4. 執行無痛內視鏡需有家屬陪同，**檢查後不可自行駕駛**，避免影響行車安全。
5. 執行息肉切除時，使用健保卡掛號腸胃科門診處理，須付健保部分負擔。**無健保身份者，切片與病理檢驗費用則依醫師處置另計。**
6. 息肉切除後 3 天內，建議勿搭乘飛機，避免息肉傷口有出血風險。
7. 哺乳中女性使用清腸藥之方法：
停止哺乳：第一劑清腸藥喝下後。
恢復哺乳：第二劑清腸藥喝完後的 24 小時過後。
大腸鏡檢查完畢後請多補充水分，以利快速代謝藥物。
8. **清腸藥品提供後無法回收再使用，若取消健檢，仍須負擔其藥品等相關費用。**
匯款帳戶：天主教中華聖母修女會醫療財團法人
銀行名稱：兆豐國際商業銀行嘉義分行
帳號：022-10-35888-1
9. 若欲更改日期或取消健檢，請於受檢日七天前通知本中心。